

Plano Tabular – PNS 2019 – Volume 4

Módulo N – Percepção do Estado de Saúde

1.1. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade com autoavaliação de saúde muito boa/boa

1.2. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que não usam aparelhos para se locomover e têm sintomas de angina no grau 2 (de acordo com a versão resumida da escala de Rose)

1.3. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que não usam aparelhos para se locomover e têm sintomas de angina no grau 1 (de acordo com a versão resumida da escala de Rose)

1.6. Distribuição de pessoas com 18 anos ou mais de idade, segundo a autoavaliação de saúde por sexo e faixa de idade

Módulo P – Estilos de Vida

Alimentação

2.1. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que consomem feijão regularmente

2.2. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade com consumo recomendado de hortaliças e frutas

2.3. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que consomem peixe pelo menos um dia por semana

2.4. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que consomem refrigerantes regularmente

2.5. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que consomem refrigerantes açucarados regularmente

2.6. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que consomem suco de caixa/lata ou refresco em pó regularmente

2.7. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que consomem alimentos doces regularmente

2.8. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que substituem o almoço por sanduíches, salgados ou pizzas regularmente

2.9. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram consumo elevado de sal

2.10. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram consumir cinco ou mais de idade grupos de alimentos não ou minimamente processados protetores para doenças crônicas no dia anterior à entrevista

2.12. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram consumir cinco ou mais de idade grupos de alimentos ultraprocessados no dia anterior à entrevista

Consumo de álcool

2.14. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais de idade por mês

2.15. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais de idade por semana

2.16. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que dirigiram logo depois de beber nos últimos 12 meses

2.17. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa

Prática de Atividade Física

2.18. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que praticam o nível recomendado de atividade física no lazer

2.19. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade fisicamente ativos no trabalho

2.20. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que praticam atividade física no trabalho por 150 minutos ou mais de idade por semana

2.21. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade fisicamente ativos no deslocamento para suas atividades habituais

2.22. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade fisicamente ativos na realização das atividades domésticas

2.23. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade insuficientemente ativos

2.24. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que assistem televisão por 3 horas ou mais de idade por dia

2.25. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que participam de programas públicos de incentivo à prática de atividade física

Tabagismo

2.26. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade usuários atuais de produtos derivados do tabaco

2.27. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes atuais de tabaco

2.28. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes diários de tabaco

2.29. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade ex-fumantes de tabaco

2.30. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes de tabaco que tentaram parar de fumar nos últimos 12 meses

2.31. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes de tabaco que tentaram parar de fumar e utilizaram aconselhamento de profissional de saúde nos últimos 12 meses

2.32. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade não fumantes expostos ao fumo passivo em casa

2.33. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade ocupados não fumantes expostos ao fumo passivo no local de trabalho fechado

2.34. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes expostos às advertências dos maços de cigarros.

2.36. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes atuais de cigarro

- 2.37. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes atuais de cigarro industrializado
- 2.38. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes diários de cigarro
- 2.39. Número médio de cigarros fumados por dia entre os fumantes diários
- 2.40. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade ex-fumantes diários de tabaco
- 2.41. Índice de cessação de tabaco entre pessoas de 18 anos ou mais de idade
- 2.43. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade expostos à mídia pró-tabaco
- 2.44. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade expostos à mídia antitabaco nos jornais ou revistas, na televisão, no rádio ou na internet
- 2.45. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade fumantes que pensaram em parar de fumar devido às advertências dos maços de cigarros industrializado, palha ou de cravo
- 2.47. Proporção de pessoas de 15 anos ou mais de idade fumantes atuais de tabaco
- 2.48. Distribuição de pessoas de 15 anos ou mais de idade, por uso de aparelhos eletrônicos com nicotina líquida ou folha de tabaco picado (Somente BR, GR e UF)
- 2.49. Pessoas de 18 anos ou mais de idade de idade fumantes de cigarros industrializados e que compraram cigarro para uso próprio, por classificação da legalidade da marca do cigarro (Somente BR e GR)

Módulo Q – Doenças Crônicas

Hipertensão

- 3.1. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que nunca mediram sua pressão arterial
- 3.2. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial
- 3.3. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial e tiveram medicamento prescrito

3.4. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que tomaram todos os medicamentos receitados para controlar a hipertensão nas duas últimas semanas anteriores à data da pesquisa, no total de pessoas que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial

3.5. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que tomaram algum medicamento para controlar a hipertensão arterial e obtiveram pelo menos um medicamento no programa “Aqui tem farmácia popular”

3.6. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial e receberam assistência médica para hipertensão há menos de um ano

3.7. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial e realizaram a última consulta em unidade básica de saúde

3.8. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial e o médico que atendeu na última consulta era o mesmo das consultas anteriores

3.9. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que foram a todas as consultas com médico especialista, no total de pessoas que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial

3.10. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial, foram encaminhados para alguma consulta com médico especialista, e conseguiram todas as consultas com médico especialista

3.11. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial e foram internados por causa da hipertensão ou de alguma complicação

3.12. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial e grau muito intenso/intenso de limitações nas atividades habituais devido à hipertensão ou de alguma complicação

Diabetes

3.13. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que nunca fizeram exame de sangue para medir a glicemia

3.14. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes

3.15. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes e tomaram medicamento para diabetes ou usaram insulina nas duas últimas semanas anteriores à data da pesquisa

3.16. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que tomaram algum medicamento para controlar a diabetes e obtiveram pelo menos um medicamento no programa "Aqui tem farmácia popular"

3.17. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes e receberam assistência médica para diabetes há menos de 1 ano

3.18. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes e realizaram a última consulta em unidade básica de saúde

3.19. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes e o médico que atendeu na última consulta era o mesmo das consultas anteriores

3.20. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes, foram solicitados exames complementares, e conseguiram fazer todos os exames solicitados

3.21. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que foram a todas as consultas com médico especialista, no total de pessoas que referiram diagnóstico médico de diabetes e receberam atendimento médico

3.22. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes, foram encaminhados para alguma consulta com médico especialista, e conseguiram todas as consultas com médico especialista

3.23. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes e realizaram exame de vista há menos de 1 ano

3.24. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes e tiveram seus pés examinados há menos de 1 ano

3.25. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes e foram internados por causa da diabetes ou de alguma complicação

3.26. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes e grau muito intenso/intenso de limitações nas atividades habituais devido ao diabetes ou de alguma complicação

Colesterol

3.27. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que nunca fizeram exame de sangue para medir o colesterol e/ou triglicérides

3.28. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de colesterol alto

Doenças cardiovasculares

3.29. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de alguma doença do coração

3.30. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de alguma doença do coração e já fizeram alguma cirurgia de ponte de safena ou colocação de stent ou angioplastia

3.31. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de doença do coração e grau muito intenso/intenso de limitações nas atividades habituais devido à doença do coração ou de alguma complicação

3.32. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de AVC

3.33. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de AVC e grau muito intenso/intenso de limitações nas atividades habituais devido ao AVC ou de alguma complicação

Asma

3.34. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de asma

3.35. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de asma e tiveram crise de asma nos últimos 12 meses

3.36. Idade média no diagnóstico de asma em pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de asma

3.37. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de asma, tiveram crise nos últimos 12 meses e usaram medicamento nas duas últimas semanas

3.38. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que têm grau muito intenso/intenso de limitações nas atividades habituais devido à asma entre os que referiram crise de asma nos últimos 12 meses

Artrite ou reumatismo, problema de coluna e DORT

3.39. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de artrite ou reumatismo

3.40. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram problema crônico de coluna

3.41. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram problema crônico de coluna com grau intenso/muito intenso de limitação das atividades habituais

3.42. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que diagnóstico médico de DORT (distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho)

3.43. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de DORT (distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho) com grau intenso/muito intenso de limitação das atividades habituais

Depressão e outra doença mental (esquizofrenia, transtorno bipolar, psicose e TOC)

3.44. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico de depressão por profissional de saúde mental

3.45. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico de depressão e que usaram medicamento para depressão nas duas últimas semanas anteriores à pesquisa

3.46. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico de depressão e fazem psicoterapia

3.47. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico de depressão e receberam assistência médica para depressão nos últimos 12 meses

3.48. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que foram a todas as consultas com profissional de saúde mental, no total de pessoas que referiram diagnóstico médico de depressão

3.49. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico de depressão, foram encaminhados para alguma consulta com profissional especialista de saúde mental, e conseguiram todas as consultas

3.50. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico de depressão e grau muito intenso/ intenso de limitações nas atividades habituais devido à depressão

3.51. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade com diagnóstico de outra doença mental (esquizofrenia, transtorno bipolar, psicose ou TOC) por profissional de saúde mental

Câncer

3.52. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de câncer

3.53. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de câncer, exceto câncer de pele não melanômico

3.54. Distribuição de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de câncer por tipo, segundo sexo e faixa etária

Insuficiência Renal Crônica

3.55. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico de insuficiência renal crônica

3.56. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico de insuficiência renal crônica em hemodiálise/diálise

3.57. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico de insuficiência renal crônica com grau intenso/muito intenso de limitação das atividades habituais

3.58. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que possuem pelo menos uma doença crônica

3.59. Distribuição de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial por local do atendimento médico da última consulta há menos de um ano

3.60. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial e receberam recomendações feitas em atendimento médico, segundo as recomendações feitas em atendimento médico para hipertensão arterial

3.61. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial e fizeram os exames solicitados, no total de pessoas de 18 anos ou mais de idade com diagnóstico médico de hipertensão arterial que tiveram exames solicitados

3.62. Distribuição de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes por local do atendimento médico da última consulta há menos de um ano

3.63. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes e receberam recomendações em atendimento médico, segundo as recomendações feitas em atendimento médico para diabetes

3.64. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes segundo as complicações por causa do diabetes

3.65. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade de idade que referiram diagnóstico médico de colesterol alto, e receberam recomendações feitas por médico ou profissional de saúde, no total de pessoas de 18 anos ou mais de idade de idade que referiram diagnóstico médico de colesterol alto (Somente Brasil)

3.66. Distribuição de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram problema crônico de coluna por tipo de tratamento

3.67. Distribuição de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico de depressão por local do atendimento médico

3.68. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico de alguma doença crônica física ou mental, idade média no diagnóstico, e proporção com grau intenso/muito intenso de limitação das atividades habituais

Módulo U – Saúde Bucal

4.1. Proporção de pessoas que escovam os dentes pelo menos duas vezes por dia

4.2. Proporção de pessoas que usam escova de dente, pasta de dente e fio dental para a limpeza dos dentes

4.3. Proporção de pessoas que trocam a escova de dente por uma nova com até 3 meses

4.4. Proporção de pessoas que consideram sua saúde bucal como boa ou muito boa

4.5. Distribuição das pessoas de 18 anos ou mais de idade que tiveram consulta odontológica nos últimos 12 meses, por local da última consulta odontológica, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e a situação do domicílio – 2019

4.6. Proporção de pessoas que perderam todos os dentes

4.7. Proporção de pessoas que perderam 13 ou mais de idade dentes

4.8. Proporção de pessoas que usam algum tipo de prótese dentária